



<p>Détruire systématiquement les plantes malades</p> <p>3</p>	<p>Détruire systématiquement les plantes malades</p> <p>8</p>	<p>Bien aérer le milieu de culture (la mouche blanche aime la chaleur et la sécheresse)</p> <p>6</p>	<p>Au moment des repotages, changer le vieux terreau et surtout ramasser et éliminer les larves trouvées.</p> <p>4</p>	<p>Arroser les plantes au niveau des pots et non sur le feuillage (l'oïdium aime l'humidité à 70-80%)</p> <p>2</p>
<p>Inspecter régulièrement les plantes présentant des poinçonnages pour y repérer des othiorhynques adultes. Les ramasser et les écraser s'ils se laissent tomber au sol.</p> <p>9</p>	<p>Réaliser un lâcher d'insectes prédateurs (coccinelles, chrysopes, punaises <i>Macrolophus caliginosus</i> etc.)</p> <p>7</p>	<p>Utiliser des pièges avec des phéromones sexuelles pour limiter le nombre de mâles.</p> <p>5</p>	<p>Poser des bandes de glu à la base des tiges/troncs des plantes</p> <p>3</p>	<p>Réaliser un lâcher d'insectes prédateurs (coccinelles, chrysopes, etc.)</p> <p>1</p>
<p>Réaliser des lâchers d'insectes prédateurs auxiliaires (coccinelles, chrysopes, punaises <i>Macrolophus caliginosus</i>, <i>Encarsia formosa</i> etc.)</p> <p>1</p>	<p>Appliquer un insecticide systémique sur la plante (les mouches adultes vont sucer la sève et s'empoisonner.</p> <p>8</p>	<p>Application de bouillie bordelaise (compatible PBI)</p> <p>8</p>	<p>Veiller à ce que les plantes soient bien aérées</p> <p>2</p>	<p>Utiliser des bandes de piégeage (plaques de glu jaunes) pour capturer des aleurodes, repérer et évaluer le niveau d'infestation.</p> <p>7</p>
<p>Application de soufre</p> <p>3</p>	<p>Traiter les plantes avec des huiles essentielles et/ou vaporiser un mélange eau + savon noir + huile végétale sous les feuilles.</p> <p>4</p>	<p>Dès que les températures atteignent 10 à 12 °C, traiter les plantes attaquées avec une solution de nématodes (<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>)</p> <p>1</p>	<p>Détruire systématiquement les plantes malades</p> <p>3</p>	<p>Planter des plantes qui repoussent ces ravageurs et leurs alliées à côté des cultures (aneth, lavande, tanaïsie...)</p> <p>5</p>